

BUTONIL 30X 30 mg/ml

Reg. SAGARPA: Q-0609-009

DOSIS Y DIRECCIONES DE USO

Para la narcosis reversible en los animales en los que se destina Butonil 30X se debe dosificar en las combinaciones que se muestran a continuación:

Venado cola blanca (<i>Odocoileus virginianus</i>)		
Butorfanol	Azaperona	Medetomidina
0.3 - 0.6 mg/kg	+ 0.16 - 0.37 mg/kg	+ 0.14 - 0.19 mg/kg
Oso negro (<i>Ursus americanus</i>)		
Butorfanol	Azaperona	Medetomidina
0.2 - 0.5 mg/kg	+ 0.25 mg/kg	+ 0.08 - 0.10 mg/kg
Rinoceronte blanco (<i>Ceratotherium simum</i>)		
Sedación en pie (Butorfanol + Azaperona); (Butorfanol + Medetomidina)		Recumbencia (Butorfanol + Azaperona + Etorfina)
Butorfanol	Azaperona	Etorfina
0.03 - 0.04 mg/kg	+ 0.03 - 0.04 mg/kg	+ 0.002 - 0.003 mg/kg
0.03 - 0.05 mg/kg	+ 0.03 - 0.07 mg/kg	
Butorfanol	Medetomidina	
0.063 mg/kg	+ 0.0026 mg/kg	
Rinoceronte negro (<i>Diceros bicornis</i>)		
Sedación en pie		
Butorfanol		
0.03 - 0.05 mg/kg		
León africano (<i>Panthera leo</i>)		
Butorfanol	Azaperona	Medetomidina
0.16 mg/kg	+ 0.13 mg/kg	+ 0.053 mg/kg
Butorfanol	Midazolam	Medetomidina
0.31 mg/kg	+ 0.21 mg/kg	+ 0.05 mg/kg